



AValiação DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM A SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL, LÍQUEN PLANO ORAL E ULCERAÇÃO AFTOSA RECORRENTE

Elisa Zancanaro de Figueiredo¹, Fernanda Gonçalves Salum¹ (orientador)

¹*Faculdade de Odontologia, PUCRS*

Resumo

A Organização Mundial da Saúde reconhece que muitas doenças bucais causam dor, sofrimento e privações sociais, acarretando prejuízos em nível individual e coletivo. A síndrome da ardência bucal (SAB), o líquen plano oral (LPO) e a ulceração aftosa recorrente (UAR) são doenças complexas, de etiologia desconhecida, que podem acarretar dor e desconforto aos pacientes, afetando seu bem-estar geral. O presente estudo clínico transversal tem como objetivo avaliar de forma quantitativa o impacto que estas doenças exercem na qualidade de vida geral e relacionada à saúde bucal dos indivíduos. O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão Científica e de Ética da Faculdade de Odontologia e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS. Serão selecionados 240 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 30 e 60 anos, provenientes do Serviço de Estomatologia do Hospital São Lucas e da Faculdade de Odontologia (PUCRS). Os pacientes serão distribuídos em: grupo-SAB (n=60), grupo-UAR (n=60), grupo-LPO (n = 60) e grupo-controle (n=60). Para avaliar-se de forma quantitativa a qualidade de vida dos pacientes, serão empregados dois questionários: o Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-26), que avalia a qualidade de vida geral e o *Oral Health Impact Profile* (OHIP-14), que avalia o impacto que doenças bucais exercem na qualidade de vida. Os dados referentes à idade, sexo dos pacientes e características das lesões serão analisados por meio de estatística descritiva. Para a comparação dos escores dos questionários WHOQOL-26 e OHIP-14 entre os quatro grupos será utilizado o teste ANOVA seguido do teste de comparações múltiplas de Tukey. Se estes valores não seguirem o padrão de normalidade será utilizado o teste Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparações múltiplas de Dunn. O valor estabelecido para rejeitar a hipótese nula será $p < 0,05$. O software utilizado para realizar a

análise estatística será o SPSS versão 11.0. O presente projeto encontra-se em fase de coleta de dados.